

Varratoos (varroos?)

- Mart Kullamaa
- Voore – 03.03.2018

Kava:

- 1. Paneeli tutvustus – “minu suhe lestaga”
- 2. Ülevaade v. tõrje vahenditest
- 3. Rühmatöö
- 3.1 Individuaalsed raviskeemid
- 4. Raviskeemide analüüs, tagasiside
- 5. Bürookraatiast ja MP - vahenditest

1. Paneeli tutvustus

- “Minu suhe lestaga”
- “Suurimad võidud ja kaotused seoses varroaga”

2. Lubatud vahendid

- Apistan – püretroid tau-fluvalinaat
- Bayvarol- flumethrin
- Tümoool- tümoool, apiguard,
- Sipelghape- kiire/aeglane aurutamine, dosaator, MAQS
- Oblikhape- tilgutamine/aurustamine/pritsimine
- Eeterlikud õlid-
- Lesehaudme lõikamine –
- Beevital Hive Clean –

2.1 Saadaval olevad vahendid

- Lisaks eelnevatele:
- Ribad Euroopa Ühendusest
- Euroopa Ühenduse väliselt toodetud ribad – “vene ribad”
- Amitraas – Varidol; Apivar; Bipiin

3. Rühmatöö

- 3.1 Rühmatööd (15 min) – 2 tk (lubatud vahenditega; kõikide vahenditega)
- 3.1 Paralleelselt - Individuaalsed (hüpoteetilised raviskeemid)
- Kas raviskeem peaks toetuma lestasuse monitooringule?

4. Raviskeemide esitlus

- Rühmad kannavad ette 2 raviskeemi
- Paneel annab tagasisidet, toime efektiivsus, tööaja kulu jne

Bürokraatiast ja administratiivsetest küsimustest

- Raviamet
- Mem
- MP – uuringud, kursused?
- VET – jäägid?
- ...

Grupp nr 1 (skeem 1)

- Pärast meevõttu oblika aurutamine
- 3X Tymol (Apigard) 10 päeva vahega – kokku 30 päeva
- Oktoobri alguses kontrollaur

Ekspertide kommentaar:

- enda tehtud tümooli patjadega odavam
- Aurutamine on efektiivsem kui tilgutamine 20%. Varroxi plaat on efektiivne

Grupp nr 1 (skeem 2)

- Pärast meevõttu riba
- Nov tilgutamine
- Juunis juulis lesehaudme raami lõikamine 3x.

Grupp nr 2

- Loeb iga sent ja sekund!
- Meevõtt
- Toimivad ribad, mis on eelmisel aastal katsetatud
- Samal ajal 3,2% tilk peale 4-5 ml kärjetänavale
- Söötmine
- Oktoobris koos söödanõude mahavõtuga uus tilgutamine
- Jälgitakse lesta langemist
- Ja kui palju tuli, siis kolmas tilgutamine veel (palju on 3 lesta päevas)
- Peamine on skeemi katsetada 1 aasta ette

Grupp nr 3

- Kevadel monitooritakse pisteliselt
- Vajadusel kiirel meetodil sipelghapet
- Suvel lesehaudme lõikamine
- Augustis peale MV pooltele tümool ja pooltele aeglane sipelghape
- Nov alguses oblikhappe tilgutamine

Grupp nr 3

- Kevadel Beevital
- Suvel Beevital
- Augustis ribad iga aasta erinevad, mida kiidetakse või kätte saab
- Nov oblika tilgutamine

Grupp nr 4

- Kevadel peaks monitoorima
- Kevadel sipelghape v beevital (jälgida kasutusjuhendit!) 3x järjest
- Sipelghappe puhul jälgitakse ilmastikku, pika kevade puhul peaks kasutama alternatiivi
- Miinimumprogramm:
- Peale MV min 2-3 korda auru ja jälgida langemist
- Samal ajal paralleelselt 2xribad
- Vajadusel jätkata ravi
- Nov-dets tilgutamine

Grupp nr 5 - mahe

- Mitte kunagi ei monitoori! Aja raiskamine!
- 2 x Kiire aurutamine oblikhappega (aprill)
- Lesehaudme lõikamine (kanadele on toitu vaja)
- Peale MV pikaajaline SH 65%
- Sügisel on OH tilgutamine v aurutamine

Grupp nr 5

- 1x OH tilgutamine sügisel, kui on õige aeg!
- Mesilased on paljund Lundeni materjalist
- Vahel võib teha SH

Grupp nr 5

- Söötmise ajal LiCl

Täna osalemast!